

～ 予防接種スケジュール表 ～


＜当日持っていくもの＞
 ☆母子健康手帳 ☆予防接種と子どもの健康（予診票）

定期予防接種
 接種のめやす年齢 接種が定められている年齢
 任意予防接種
 接種できる年齢



| 予防接種の種類 | 接種回数 | 年齢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|----|----|------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 6週 | 2か月 | 3か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 20歳 | | | | | |
| ロタウイルス | ロタリックス | 2回 | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロタテック | 3回 | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | 4回 | ① | ② | ③ | 60日以上追加 | | | | | | | | | | 接種開始月齢によって、接種回数が異なります | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | 3回 | ① | ② | ③ | 標準接種年齢は生後2か月～生後9か月に至るまで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五種混合 第1期または(※) | 4回 | ① | ② | ③ | 追加 | | | | | | | | | | 五種混合 第1期 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四種混合 第1期 | | ① | ② | ③ | 追加 | | | | | | | | | | 四種混合 第1期 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二種混合 第2期 | 1回 | | | | | | | | | | | 小学校6年で予診票配布 | | | | | | | | | | 二種混合 第2期 | | | | | | | | | |
| ヒブ | 4回 | ① | ② | ③ | 追加 | | | | | | | | | | 接種開始月齢によって、接種回数が異なります。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG | 1回 | ① | | | | | | | | | | 標準接種年齢は生後5か月～生後8か月に至るまで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん風しん混合(MR) | 2回 | 1歳を迎えたら、できるだけ早く。 | | | | | | | | | | ① | | | | | | | | | | 就学する前の1年間(4月1日～翌年3月31日) ② | | | | | | | | | |
| 水痘(みずぼうそう) | 2回 | 1回目から6か月から12か月後に2回目を受けてください。 | | | | | | | | | | ① ② | | | | | | | | | | 1回目の接種から最低3か月はあけてください。 | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 第1期・第2期 | 4回 | | | | | | | | | | | ① ② 追 | | | | | | | | | | 第2期 小学校4年で予診票配布 | | | | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防ワクチン) | 2回または3回 | ワクチンの種類や接種年齢によって、接種間隔や接種回数が異なります。平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの方は、未接種分を接種することができます。※令和7年3月31日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おたふくかぜ | 1回* | ① | | | | | | | | | | ② | | | | | | | | | | *2回目の接種を受けることも可能。 | | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 毎年2回 | 毎年2回(2～4週間隔) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ワクチンの接種間隔について



令和6年4月 和歌山市

(※) 五種混合ワクチンが令和6年4月1日から定期予防接種になりました。四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種を開始している方は、原則として同一のワクチンで接種を完了させてください。

五種混合ワクチン…四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)にヒブワクチンを加えたワクチン

- ◆同時に複数のワクチンを接種することもできます。かかりつけ医にご相談ください。
- ◆定期予防接種は、予防接種法に基づくものですので、積極的に接種を受けましょう。任意の予防接種は、それ以外の予防接種です。表に示す以外の予防接種もあります。
- ◆定期予防接種を市外の医療機関で受ける場合、事前に手続きが必要です。和歌山市保健所にお問い合わせください。(電話 073-488-5118)